

EVOLUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS AISLAMIENTOS POR SAMR

Tipo: Poster

OBJETIVO:

Identificar el cumplimiento de los aislamientos por SAMR en un hospital, así como su evolución

METODOLOGIA:

Estudio Transversal Descriptivo

Ámbito Poblacional: CAULE

Ámbito Temporal: Ejercicios 2007 al 2015

Se realiza vigilancia de los pacientes infectados/colonizados por SAMR. Se analiza, tanto la evolución de los SAMR identificados, así como el cumplimiento de las medidas de aislamiento, colonización en otras localizaciones y tratamiento

RESULTADOS:

Casos de SAMR (infección/colonización) identificados y propuesta de aislamiento del 2007 al 2015: 196-142-150-148-133-137-127-132-166

Tasa de Cumplimiento de las medidas de aislamiento del 2007 al 2015: 65,8%-75,4%-81,3%-88,51%-89,5%-81,7%-82,7%-72,7%-68,1%

Tasa de obtención de cultivo positivo a SAMR en frotis faríngeo en pacientes aislados del 2007 al 2015: 27,9%-17,8%-27,1%-35,9%-40,3%-32,7%-40%-49%-48,7%

Tasa de obtención de cultivo positivo a SAMR en frotis faríngeo en pacientes en los que se incumplió la propuesta de aislamiento del 2007 al 2015: 14,9%-31,4%-28,6%-11,8%-28,6%-32%-22,7%-50%-40,9%

Densidad de incidencia infecciones por SAMR del 2007 al 2015: 0,46-0,33-0,26-0,35-0,30-0,20-0,23-0,26-0,26

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:

El inicio de una vigilancia más activa en el 2007 favorece el respeto a los protocolos y al cumplimiento de la prescripción de AISLAMIENTO en los pacientes portadores de SAMR, aunque en el 2014 detectamos un claro declive que se consolida en 2015, cuyas circunstancias se deberán estudiar e implementar propuestas de mejora.

Parejo a la relajación e incumplimiento de la prescripción de aislamiento aumenta la presencia del SAMR en infecciones y colonizaciones, así como el crecimiento en localizaciones oro-faríngeas tanto en pacientes aislados, como en aquellos que no se cumplió el aislamiento