

MOTIVOS DE RETIRADA DE LOS CATÉTERES VENOSOS CENTRALES

Tipo: Poster

Objetivos

Identificar los motivos de retirada de los CVC y conocer la incidencia de las complicaciones mecánicas e infecciosas.

Métodos

Estudio descriptivo analizando los datos obtenidos durante un 5 meses (enero - mayo 2015). Unidades de análisis: servicios de hospitalización del HUMV. Unidades de observación: todos los CVC canalizados en pacientes hospitalizados. El instrumento de recogida de la información: Estación clínica de enfermería "Gacela Care".

Resultados

-) Se canalizaron 1714 CVC . El 59,8% hombres y el 40,2% mujeres .
-) Edad media de 61 años (D.E= 16,5).
-) Características:
 - o 67,6% (n=1714) Catéter central externo tunelizado
 - o 24,5% (n=1714) Tamaño 2F
 - o 61% (n=603) Catéter de 2 luces
-) Vaso de inserción :
 - o 58% (n=1477) Yugular
 - o 69,9% (n=1477) Lado derecho
-) Utilización:
 - o 59,3% (n=1449) Perfusión continua
-) Motivo de retirada:
 - o 63,5% (n=1087) Desconocido u Otros

Conclusiones

-) En la mayoría de los casos no se puede determinar el motivo de retirada de los CVC pues no se especifica la causa o no existe registro de la misma
-) Es necesario identificar con exactitud los motivos de retirada de los CVC. Esto permitiría conocer datos reales de incidencia de las complicaciones mecánicas e infecciosas y establecer las acciones correctivas y/o preventivas.
-) Como acción prioritaria se propone conseguir un buen registro en la historia de enfermería, para evaluar los resultados con fiabilidad y priorizar áreas de mejora. Debe realizarse una campaña de difusión entre todos los profesionales de la "Guía para la inserción y mantenimiento de catéteres" del Servicio Cántabro de Salud .