

Solís Bustamante P, De la cruz Ortega M, Bidaurrazaga Van-Dierdonck J, Muniozguren Agirre N.
Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Bizkaia. Unidad de Vigilancia Epidemiológica

INTRODUCCIÓN

Los cánceres más frecuentes centran la atención de las estadísticas. Sin embargo, en cánceres de menor incidencia, también se pueden observar cambios relativos importantes. Puede ser debido, a los cambios de estilo de vida, mayor exposición de contaminantes del medio ambiente y a la disposición de nueva tecnología, para mejor ayuda diagnóstica.

OBJETIVO

Identificar las localizaciones de cáncer con mayor incremento relativo en incidencia por sexo.

MÉTODO

Los casos se extrajeron del registro poblacional de cáncer de la CAPV; se seleccionaron los casos en los residentes de Bizkaia. Las incidencias estandarizadas fueron calculadas en el periodo 1986-2012: por sexo y tipo de cáncer. Los tipos específicos de cáncer fueron agrupados de acuerdo a EUCAN-IARC. Se utilizó la regresión Joinpoint para visualizar la tendencia y calcular el porcentaje anual de cambio (PAC)

RESULTADOS

Las cinco localizaciones de cáncer con el PAC más alto, registrado en los últimos años (1986-2012), según sexo, se muestran en las graficas siguientes.

Mujeres					Hombres				
Tabla A. Primeras cinco localizaciones con más alto PAC en las mujeres					Tabla A. Primeras cinco localizaciones con más alto PAC en las hombres				
Orden	Tipo	Periodo	PAC (%)	IC 95%	Orden	Tipo de Cáncer	Periodo	PAC (%)	IC 95%
				Mín. Max					Mín. Máx.
1º	Tiroides	1986 1999 1999 2012	4,9 10,7	0,1 9,9 7,6 13,9	1º	Tiroides		4,8	2,8 6,9
2º	Tráquea Bronquio Pulmones	1986 2012	5,9	5,1 6,7	2º	Testículos		4,3	2,8 5,7
3º	Vejiga	1986 1997 1997 2012	-1,8 5,8	-5,1 1,5 4,2 7,5	3º	Colon y Recto		3,4	3,1 3,7
4º	Laringe	1986 2012	4,2	1,8 6,7	4º	Riñón, Pelvis renal y uréter	1986 - 2012	2,8	2,3 3,3
5º	Otras localización de Laringe	1986 2012	3,5	1,5 5,5	5º	Mieloma múltiple y Enf. Inmunoproliferativas		2,5	1,5 3,5

Gráfico A. Primeros cinco localizaciones con más alta PAC en las mujeres





Gráfico B. Primeros cinco localizaciones con más alta PAC en los hombres



Leyenda Gráfico A


Tasa Estandarizada Observada	○
Tendencia Estimada	—
JoinPoint (JP)	⊗

Localización	Código ICD	Tipo
Tiroides	C73	
Tráquea Bronquios Pulmones	C33-34	
Vejiga	C67	
Laringe	C32	
Otras localización de Laringe	C09-10 C12-C14	

CÁNCER DE TIROIDES

Es la localización con el PAC más alto durante el periodo 1986-2012, tanto en mujeres (10.7%) como en hombres (4,8%)

Gráfico C. Tendencia de la localización de tiroides en ambos sexos



Leyenda del Gráfico B

Tasa Estandarizada Observada	△
Tendencia Estimada	—

Tipo	Código ICD	Localización
	C73	Tiroides
	C62	Testículos
	C18-21	Colon y Recto
	C64-66	Riñón, Pelvis renal y uréter
	C88+ C90	Mieloma múltiple y Enf. Inmunoprolifera.

CONCLUSIONES

- El cáncer de tiroides aparece con el mayor incremento en incidencia de Bizkaia; el incremento es mayor en mujeres que en hombres.
- El resto de localizaciones con el mayor incremento en incidencia varía de acuerdo a sexo.